



# PERROS

## POSATEX

### Indicaciones

Tratamiento de la otitis externa aguda y exacerbaciones agudas de la otitis externa recurrente, asociada a bacterias sensibles a Orbifloxacina y hongos sensibles a Posaconazol, en particular, *Malassezia pachydermatis*.

### Composición

Orbifloxacina: 8,5 mg/mL; Mometasona furoato (como monohidrato): 0,9 mg/mL; Posaconazol 0,9 mg/mL; excipientes c. s. p. Una gota de Posatex contiene 267 µg de orbifloxacina, 27 µg de mometasona y 27 µg de posaconazol.

### Administración y dosis

Vía ótica. Agitar bien antes de la aplicación. Limpiar y secar cuidadosamente el canal auditivo externo antes del tratamiento. Cortar el exceso de pelo que rodea el área de tratamiento. En perros ≤ 2 kg, 2 gotas una vez al día. En perros entre 2 y 15 kg, 4 gotas una vez al día. En perros > 15 kg, 8 gotas una vez al día. Continuar el tratamiento durante 7 días consecutivos. Masajear a fondo la base del oído luego de la aplicación para permitir la penetración en la parte más baja del canal auditivo.

### Presentación

Frasco con tapón aplicador de 8,8 g (17,5 mL).

## Contraindicaciones – Precauciones

No usar si el tímpano está perforado. No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las sustancias activas. No utilizar en hembras gestantes. La otitis bacteriana y fúngica es a menudo de naturaleza secundaria; debe identificarse y tratar la causa subyacente. El uso del medicamento se debe basar en ensayos de sensibilidad en bacterias aisladas, y/o otras pruebas de diagnóstico adecuadas.

Mantener entre 2 y 30° C.

Registro MGAP N°: 2015A00205