



PERROS

NOBIVAC RL

Indicaciones

Para la protección contra Rabia y la leptospirosis canina producida por *Leptospira canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

Composición

Cada dosis contiene ≥40 hamster PD802 de *Leptospira canicola* Cepa CA-12.000 inactivada, ≥40 hamster PD802 de *L. icterohaemorrhagiae* Cepa 820K y ≥3.0 IU del virus de la Rabia inactivado Cepa Pasteur.

Administración y dosis

Agitar bien antes de usar. Administrar por vía S/C en la región del cuello o tórax tomando las precauciones habituales de asepsia. Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15° a 25°C) antes de la administración. Puede utilizarse en forma segura en hembras gestantes. Puede utilizarse como diluyente de Nobivac DHPPi. Indicada para completar el programa básico de vacunación a las 12 semanas de vida o para la revacunación cuando así se requiera.

Presentación

Cajas con 10 frascos de 1 dosis.

Contraindicaciones – Precauciones

Vacunar solamente animales en buen estado de salud. Utilizar equipo estéril para la administración y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol. Deberán transcurrir como mínimo 10 días después de la administración para el desarrollo de inmunidad. Conservar en lugar oscuro a 2° a 8°C. No congelar.

Registro MGAP N°: A-3249