



AVES

NOBILIS CAV P4

Indicaciones

La Anemia Infecciosa Aviar es una enfermedad causada por el virus de la Anemia Infecciosa (CAV: Chicken Anemia Virus). El virus puede infectar aves de todas las edades; solo las aves jóvenes pueden llegar a desarrollar signos de la enfermedad. El virus puede ser aislado de diferentes órganos, pero ataca principalmente el timo e interfiere con la maduración de los linfocitos T. El daño que el virus causa al sistema inmune (inmunosupresión) es más importante que la enfermedad en sí misma.

Composición

Virus de la Anemia Infecciosa Aviar, cepa 26P4: $\geq 3.0 \log_{10}$ DIE50.

Administración y dosis

Inyectable I/M, S/C o punción en el ala. Aves deben ser vacunadas desde las 6 semanas en adelante y reproductoras 6 semanas antes del comienzo de la postura. Reconstituir la vacuna con el diluyente Dilavia (200 mL/1.000 dosis).

Presentación

Frasco de 1000 dosis.

Contraindicaciones – Precauciones

Vacunar aves sanas solamente. Conservar entre 2° y 8°C. Una vez preparada la vacuna usar dentro de las 4 horas de reconstituida. No usar en período de postura. Puede aplicarse combinada con la vacuna Nobilis Reo 1133 (con el diluyente Dilavia) o Nobilis AE + POX (con el diluyente de la misma).

Registro MGAP N°: A-2801